

Behandling af indre hæmorider med elastik (McGivney ligatur)

Hæmorider er forstørrelse af slimhinde med underliggende blodkar (åreknuder) i endetarmsåbningen. Hæmorider kan sidde i endetarmen (indre hæmorider) eller sidde udenfor endetarmsåbningen (ydre hæmorider) Ydre hæmorider kan skrumpe således at åreknuderne forsvinder og kun den overskydende hud bliver tilbage. Dette kaldes marisker.

Hæmorider betragtes ikke som en sygdom, men som en tilstand, der behandles såfremt der er betydelige gener.

FØR BEHANDLINGEN

Indholdet af 1 stk. Toilax klyksma (5 ml tube, fås i håndkøb på apoteket) tømmes i endetarmen ca. 1 time før undersøgelse og behandling. Virkning indtræder oftest umiddelbart efter.

BEHANDLINGEN

Via en kort kikkert sættes en lille stram elastik hen over de indre hæmorider, som derved afsnøres, "visner" og falder af sammen med elastikken.

Med denne metode behandles kun de indre hæmorider. Da der ikke er føleenerver i slimhinden kan indgrebet ikke mærkes og foretages derfor uden bedøvelse.

Ved behandlingen produceres et ar der som en punktsvejsning lodder slimhinden til tarmens muskulatur.

Der sættes 1 eller 2 ligaturer pr. behandling.

Behandlingen tager få minutter.

EFTER BEHANDLINGEN

Mod smerter: Der kan det første halve til hele døgn føles stramning og afføringstrang. Hvis det generer kan man tage smertestillende håndkøbsmedicin (Panodil og eventuelt Ibuprofen).

RESTRIKTIONER

Der er ingen restriktioner. Man kan gå normalt på toilettet. Sørg for at holde maven i gang med rigelig væske, fiberholdig kost og motion. Der kan eventuelt suppleres med HUSK og svesker. Ved svær forstoppelse kan suppleres med afføringsmiddel f.eks. Magnesia.

FORLØB

I løbet af nogle dage afstødes den afsnørede hæmoride og dette kan medføre noget frisk blødning.

SYGEMELDING

Er ikke nødvendig. Det kan blive nødvendigt med flere behandlinger.

KOMPLIKATIONER

Der kan udvikles en lille blodansamling, hvilket resulterer i hævelse uden for elastikken. Dette kan udløse en smertereaktion og udtalt ubehag, som skyldes krampe i den indre ringmuskel. Kan lindres med is, smertestillende håndkøbsmedicin eller lokalbedøvende creme(håndkøb). Forsvinder gradvist af sig selv.

Sjældent kan der opstå feber eller kraftig blødning. Kontakt da vagtlæge eller skadestue.

Langt de fleste hæmorider kan behandles med gummibånd også kaldet ligaturer.