

Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages oftest med henblik på at fjerne større hæmoroider, løs hud (marisker), bylder, fistler eller vorter.

Før operationen

Køb smertestillende håndkøbsmedicin (Panodil og Ipren) samt afføringsmiddel(f.eks Magnesia).

Operationen

Operationen udføres i lokal bedøvelse, som anlægges i og omkring hæmoriderne. Selve lokal bedøvelsen er ubehagelig, men resten af indgrebet er smertefrit. Hæmoriden eller den løsthængende hud (marisken) skæres bort. Såret efterlades åbent.

Efter operationen

Lokalbedøvelsen virker i 2-3 timer.

Der ligger evt. lidt gaze i anus efter operationen. Dette fjernes lettest inden bedøvelsen er ophørt med at virke. Hvis det sidder lidt fast, kan det oplødes med lunkent vand.

De første 2-3 dage efter operationen kan være smertefulde.

Afføringen må ikke være hård, hvorfor man med fordel kan anvende afføringsmidler for at lette passagen igennem operationssåret (svesker, Laktulose mixtur, Magnesia).

Mod smerter kan tages Paracetamol og Kodimagnyl eller Ibuprofen, med mindre andet er aftalt.

Man vil som regel selv kunne køre hjem efter operationen.

Pasning af såret

Operationssårene rengøres bedst ved at skylle med en håndbruser to gange dagligt efter toiletbesøg. Duppes tørt med blød klud. Der skal ikke anvendes sæbe eller cremer i området.

Eventuelt kan kolde omslag anvendes (kuldepakning, kolde ærter eller isterninger i stofbetræk), både for at standse blødning og reducere smerter. Der skal ikke fjernes sting.

Sygemelding kan være nødvendig i 3-5 dage, men er det oftest ikke.

Evt. aftales kontrol efter 2 uger.

Komplikationer

Blødning forekommer. Infektioner er meget sjældne.

Sårene kan være vanskelige at holde ordentligt rene, og sjældent kan man se meget langvarige helingsproblemer.

Ved større blødning, eller tegn på betændelse skal kirurgen, Regionens akuttelefon 1813 eller skadestuen kontaktes.

